



**MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS
DIRECCION DE HIGIENE, VETERINARIA Y BROMATOLOGIA**

INFORMACIÓN REFERIDA A ARACNIDOS

El Departamento de Higiene, Veterinaria y Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos **INFORMA** que se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones respecto a **prevención de posibles accidentes por contacto con arañas.-**

ARAÑAS: Son insectos que conviven con el hombre, no siendo posible eliminarlas completamente, sí controlar su número mediante la fumigación de la vivienda. En la provincia de Buenos Aires, las especies que han ocasionado accidentes de importancia toxicológica, corresponden a los géneros Lactrodectus y Loxosceles, sobre todo este último género, del cual hubo un caso fatal en nuestra ciudad.

GENERO LOXOSCELES:

La araña Loxosceles laeta es para nosotros la "araña de los rincones" o "araña de los cuadros".

LOXOSCELES LAETA

Es una araña pequeña, débil y escurridiza. Dado sus hábitos nocturnos es difícil observarla a las horas diurnas. Mide entre 8 y 15 milímetros (sin las patas). El cefalotórax y las patas son del mismo color, marrón, el abdomen es más oscuro y grisáceo.

Realizan una tela blanca, de aspecto suave y algodonoso que tapiza la entrada de la cueva.-

Sus hábitos son tanto caseros como rurales, pero siempre sedentarios y de actividad nocturna. Viven en rincones, grietas de paredes, detrás de muebles, cuadros, y en lugares oscuros y de poca higiene. Se encuentran en galpones de almacenamiento de pasto, cereales y arneses rurales de poco uso. Un gran porcentaje de los accidentes que ocasiona, se relaciona con el manipuleo de ropa en desuso o abandonada, donde también habita, durmiendo cuando la cama está en contacto con la pared o al colocar la mano detrás de muebles u otros objetos.-

///

LOXOSCELISMO

El veneno es de acción preferentemente necrosante local sobre el tejido cutáneo.- En pequeño porcentaje, también puede provocar un cuadro grave y generalizado.

En la forma benigna, de acción más común, el accidentado refiere haber sentido un "pinchazo" y tener un dolor "quemante" en un lugar determinado. El dolor es constante y bien localizado. Después, de una a tres horas, la acción necrótica del veneno comienza a actuar sobre los capilares dérmicos, produciendo destrucción endotelial.

Aproximadamente entre dos a tres semanas después de la picadura, la escara se contrae, se desprende y cae, dejando una ulceración que demora hasta varios meses en curar.

Si a estas manifestaciones locales, se presenta, además, síntomas generales con complicaciones sanguíneas, hepáticas y renales, observado en pocas oportunidades, el cuadro se hace de extrema gravedad y puede llegar a provocar la muerte.-

Tratamiento

En principio, debemos aclarar que es probable que una persona adulta dormida, no sienta la picadura en forma inmediata, pero luego de un período de descanso de aproximadamente dos horas, se despierta con un dolor punzante y "quemante" en un lugar determinado. En casos de criaturas, se despiertan con fuerte llanto. Lo más común es que el accidentado se dé cuenta en el momento de recibir el "pinchazo", le reste importancia al animal agresor, lo destruye, y no lo conserva para su determinación.

*Contrariamente a lo que sucede con las picaduras de **Latrodectus**, muy dolorosas en la primera hora, en el loxoscelismo el afectado no le da trascendencia al accidente, más si el accidentado es un adulto, pues el dolor es suave y soportable, de esta manera deja pasar aproximadamente seis horas. Luego de este período, el dolor "quemante" suave, pero constante, lo preocupa y recién recurre al auxilio médico.*

RECOMENDACIONES:

- ***Ante una picadura concurra inmediatamente al médico.-***
- ***De poder atrapar al arácnido, no aplastarlo para su posterior identificación.-***
- ***El arácnido es susceptible a insecticidas comerciales.***
- ***En casas deshabitadas o en galpones se aconseja contratar una empresa controladora de plagas para efectuar una desinsectación.-***
- ***Poseer mucho cuidado al manipular ropa en desuso, cuadros o muebles.-***

